

Первый признак заражения бешенством можно определить по месту укуса: боль, зуд, рубец не заживает – имеются припухлости и покраснение. Начало болезни проявляется повышением температуры до 37,2–37,3 °С, угнетённым состоянием, плохим сном, бессонницей и беспокойством больного. Далее наступает так называемая «стадия разгара», которая выражается в повышенной чувствительности к малейшим раздражениям органов чувств – больной резко реагирует на яркий свет, звуки, шум. Больные становятся агрессивными, буйными, появляются галлюцинации, бред, чувство страха, водобоязнь, аэробоязнь, слюнотечение. Тяжелые паралитические расстройства дыхания вызывают смерть.

Обязательными профилактическими мерами против бешенства являются вакцинация домашних животных, которая должна проводиться ежегодно, приобретение животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования. Необходимо избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить. Если укусил дикий зверь или домашний питомец – немедленно обратитесь за медицинской помощью для проведения антирабического лечения. Вакцинация перед поездкой в регион с неблагополучной эпидемиологической и эпизоотической ситуацией по бешенству также обязательна. Нужно помнить, что бешенство можно предупредить вакцинацией, а излечить его нельзя.